

RU

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата

СЕПТОГАЛ

| | |
|--------------------------------|--|
| Регистрационный номер | П №011325/01 |
| Торговое название препарата | СЕПТОГАЛ |
| Лекарственная форма | таблетки для рассасывания |
| Состав | 1 таблетка для рассасывания содержит: 50%-ный раствор бензалкония хлорида 1,0 мг, ментола 3,0 мг, тимола 0,6 мг, масла мяты перечной 1,0 мг, масла эвкалиптового 0,6 мг. Вспомогательные вещества: магния стеарат, прессованный сахар, сахароза. |
| Описание | таблетки плоскоцилиндрической формы с цельными краями, с фаской, от белого до слабо-желтого цвета с приятным освежающим запахом. На одной стороне отпечатано название препарата. |
| Фармакотерапевтическая группа: | Антисептическое средство. |
| Код АТХ | R02AA20 |
| Фармакологическое действие | Комбинированный препарат. <i>Бензалкония хлорид</i> - поверхностно-активное катионное вещество, нарушает проницаемость клеточной мембраны микроорганизмов и тормозит ферментативные процессы, активен в отношении многих патогенных бактерий, некоторых видов вирусов, грибов и простейших. <i>Тимол</i> получают из <i>Thymus vulgaris</i> эфирных масел. Обладает антисептическим, бактерицидным и фунгистатическим свойствами. <i>Ментол, масло мяты перечной и масло эвкалиптовое</i> оказывают умеренно выраженное антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и дезодорирующее действие. |
| Показания к применению | Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки. |
| Противопоказания | Повышенная чувствительность к компонентам препарата. |
| Меры предосторожности | При применении следует соблюдать осторожность больным сахарным диабетом, поскольку в состав входит сахароза. Детский возраст (до 4-х лет). |
| Способ применения и дозы | 1 таблетку медленно рассасывать в полости рта до полного растворения каждые 2-3 часа. |

Детям старше 4 лет рекомендуется принимать до 4 таблеток в день;

детям старше 10 лет рекомендуется принимать до 6 таблеток в день.

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать до 8 таблеток в день.

Не следует принимать таблетки непосредственно перед приемом пищи и вместе с молоком.

| | |
|--------------------------|--|
| Побочные действия | Аллергические реакции. |
| Форма выпуска | По 10 таблеток для рассасывания в блистере из ПВХ/Ал. По 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. |
| Условия хранения | При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте. |
| Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
| Условия отпуска из аптек | Без рецепта. |
| Производитель | АО «Ядран» Галенский Лабораторий. 51000, Пулац б/н, Риека, Хорватия. Представительство АО «Ядран» Галенский Лабораторий в России: 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д.38 оф. 3 |

RNXXX/XXX



JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d . d .
RIJEKA



ASUB103/V4